

# BALATA POMME

IDENTITÉ : *Ragala sanguinolenta* Pierre

Famille des Sapotacées

## NOMS COMMERCIAUX ET VERNACULAIRES

- Balata pomme (Créole)
- Baaka messoupou (Boni)
- Suitamini (Paramaca)
- Swit'anini (Suriname)
- Barataballi (Guyana)

## CARACTÉRISTIQUES

— Cime importante, branches très ramifiées, feuillage plutôt clair.

— Fût irrégulier, droit, pouvant atteindre 25 m de hauteur.

— Diamètre moyen compris entre 50 et 60 cm, pouvant cependant atteindre 1 m chez certains sujets.

— Les contreforts aliformes à crêtes arrondies peuvent monter à plus de 2 m avec une base de 2 m.



— L'écorce présente une teinte brun-grisâtre, ponctuée de taches marron clair dues aux exfoliations.

Lichens et mousses garnissent le tronc de taches jaunâtres et verdâtres.

— Crevasses réduites à de fines stries longitudinales plus ou moins localisées. Petites lenticelles marron clair surtout dans les dépressions laissées par les exfoliations.

— L'écorce vivante a 8 à 10 mm d'épaisseur. Elle est jaunâtre vers le rhytidome, rosâtre vers le liber. La texture est granuleuse.

— Exsudation assez abondante d'un liquide blanchâtre peu collant. Odeur et saveur peu définies.



Fruit,  $\times 1/2$



Photo D. Fouquet.

*Ragala sanguinolenta*. *Houppier*.





Photo D. Fouquet.

*Ragala sanguinolenta*. *Base du fût*.

*Ragala sanguinolenta*. *Ecorce*.

Photo D. Fouquet.



*Ragala sanguinolenta*. *Entaille de l'écorce*.

Photo D. Fouquet.

