

ACTES DE SEMINAIRE DE CLOTURE DE LA PHASE 1 DES PROJETS DU RITA MAYOTTE (2015-2017)

14 au 16 mai 2018, Mayotte, France

(Coord. HUAT Joël)

INNOVEG



Courgette sous filet



Paillage naturel du sol

BIOFORM



Zébu au piquet

DEFI-ANIMAL

Juin 2019

Démodécie bovine : bonnes pratiques

Auteurs

Chouanibou Youssouffi¹, Ben MSA¹, Sitti Bahyat CHAMASSI³, Abdou ACHIRAFFI³,
Eric CARDINALE⁴, Raphaëlle METRAS⁴, Julie RIVIERE², Laure DOMMERGUES¹,
Samuel BARBARIN² ¹CoopADEM – GDS Mayot, ²ENVA, ³LVAD, ⁴Cirad

• Contact : laure.dommergues@eleveurs-de-mayotte.fr

La démodécie bovine



Maladie parasitaire

- Aggravée par une baisse d'immunité ou un mauvais état général
- Aspect extérieur varié : boutons, épaissement de la peau jusqu'à devenir ridée...

Que faire ?

1. Diagnostiquer

Consulter le vétérinaire



OU



Prélever du pus



L'apporter au laboratoire
de la CoopADEM
(tél : 0269 61 73 39)



Résultat
dans la semaine

2. Soigner... ou réformer

Pour le traitement, la consultation vétérinaire est obligatoire



Ensuite, l'éleveur doit poursuivre le traitement lui-même.

Le traitement de la démodécie généralisée est long. Il faut se poser plusieurs questions avant de s'engager :



Est-ce que
je maîtrise
la technique ?



Est-ce que
je pourrai assurer
le traitement
dans la durée ?



Est-ce que
je pourrai payer
tout le traitement ?

Prévention

1. Maîtriser les conditions d'élevage

- La démodécie ne se généralise pas lorsque l'animal est en forme. La prévention passe donc par de bonnes conditions d'élevage :
 - Apporter une alimentation de qualité en quantité suffisante
 - Vérifier que les veaux prennent leur colostrum
 - Veiller au confort des animaux



2. Sélectionner les animaux

- Réformer abattre un animal qui a nécessité un traitement car il peut récidiver.
- Ne pas faire se reproduire une femelle qui a été malade car elle peut transmettre le parasite à son petit.



Conception : CIRAD, Mayotte, Avril 2018 — © photos : CoopADEM

