CIHEAM
Options Méditerranéennes

Rapport de synthèse de l'atelier "Technologie et qualité de la datte"

Benchabane A.

in

Ferry M. (ed.), Greiner D. (ed.).
Le palmier dattier dans l'agriculture d'oasis des pays méditerranéens

Zaragoza : CIHEAM
Options Méditerranéennes : Série A. Séminaires Méditerranéens; n. 28

1993
pages 209-214

Article available on line / Article disponible en ligne à l'adresse :

http://om.ciheam.org/article.php?IDPDF=96605891

To cite this article / Pour citer cet article

Benchabane A. **Rapport de synthèse de l'atelier "Technologie et qualité de la datte".** In : Ferry M. (ed.), Greiner D. (ed.). *Le palmier dattier dans l'agriculture d'oasis des pays méditerranéens* . Zaragoza : CIHEAM, 1993. p. 209-214 (Options Méditerranéennes : Série A. Séminaires Méditerranéens; n. 28)

CIHEAM

http://www.ciheam.org/
http://om.ciheam.org/

Etude du problème de la maturation de la datte dans la palmeraie de Marrakech

Koulla L.*, Diaeddine M.**, Saaidi M.**

Les besoins thermiques pour la maturation de la datte ne sont pas satisfaits à Marrakech. Par conséquent, la majorité des fruits ne mûrissent que difficilement. Dans le but d'améliorer la production de cette palmeraie, nous avons testé l'effet de quatre pollens choisis pour leur précocité. Deux de ces 4 pollens ont été sélectionnés. L'ensachage des dattes par du papier Kraft a été également utilisé ; les sachets ouverts permettent un bon développement des fruits. Par ailleurs, un apport exogène de l'acide abscissique a montré que cette hormone ne stimule pas la maturation de la datte.

*Faculté des Sciences-Semlalia, Laboratoire de Physiologie Végétale, B.P. S15, Marrakech, MAROC
**Institut National de la Recherche Agronomique, Centre Régional du Haouz Pré-Sahara B.P. 533, Marrakech, MAROC

Identification des arômes de trois variétés de dattes

Reynes M.*, Lebrun M.*, Shaw Ph.*

La détermination des composés aromatiques des 3 variétés de dattes, 'Deglet Nour', 'Alligh' et 'Kentichi', a été effectuée en mettant au point une technique d'analyse réalisée en espaces de têtes. Les principaux composés déterminés ont permis de vérifier en relation avec un programme statistique qu'une différenciation pouvait apparaître selon les variétés.

*CIRAD-FLHOR, B.P. 5035, 34032 Montpellier Cédex 1, FRANCE

Procédé de préparation d'un jus de dattes

Reynes M.*, Monod A.*, Fonteneau L.**, Terlecki D.*

La mise au point d'un procédé de fabrication d'une boisson à base de datte a permis de proposer une ligne polyvalente de traitements pouvant soit produire de la pâte de datte, soit produire une boisson à base de dattes.

*CIRAD-FLHOR, B.P. 5035, 34032 Montpellier Cedex 1, FRANCE
**IMECA, Laboratoire oenotechnique, Zone Industrielle, 34800 Clermont l'Hérault, FRANCE